



คำแนะนำในการตรวจรับไก่สาว

1. เตรียมน้ำสะอาดผสมวิตามินและอิเล็กโทรไลต์ หรือยาปฏิชีวนะ ให้นำมาสำหรับไก่ จะได้กินทันทีที่ถูกย้ายเข้ากรงไก่ และตรวจสอบว่าไก่ทุกตัวสามารถกินน้ำได้ก่อนให้อาหารครั้งแรก
2. ถ้าน้ำหนักไก่ถึงฟาร์มยังไม่ถึง 1,400 กรัม/ตัว ให้คงที่การให้แสงอยู่ที่ 14 ชั่วโมง/วัน แต่ถ้าน้ำหนักถึงฟาร์มเกิน 1,400 กรัม/ตัว ให้กระตุ้นแสงโดยเพิ่มแสงสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 2 สัปดาห์ และเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 30 นาที 2 สัปดาห์ แสงจะครบ 17 ชั่วโมง/วัน จึงคงที่แสงตลอดจนปลดไก่
3. ในช่วงไก่อยู่ในระยะไข่ ห้ามลดความยาวแสงอย่างเด็ดขาด
4. สำหรับอาหารไก่ที่นำมาให้ไก่สาวนั้น ควรผสมแคลเซียม (เปลือกหอย , หินปูน) ลงในอาหาร คือ ผสมแคลเซียมชนิดผง ประมาณ 50% และที่เหลว 50% ให้เป็นแบบเกล็ดขนาด 3-5 มม. หรือหากใช้อาหารสำเร็จรูป ทางฟาร์มควรมีการโรยแคลเซียมเกล็ดประมาณ 3-5 กรัม/ตัวแม่ไก่/วัน เพิ่มเติมในอาหารโดยให้ทุกวันในช่วง 15.00-16.00 น. ซึ่งจะให้ผลดีมากเป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดไข่เปลือกบางมาก และป้องกันไข่ขาวอ่อน ซึ่งจะเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของฟาร์ม
5. โปรแกรมการให้วัคซีน หลังจากส่งไก่สาวจนไก่อายุได้ 21 สัปดาห์ ให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล บวกหลอดลมอักเสบ และต้องทำซ้ำ ในทุก 6-8 สัปดาห์ แต่ถ้าในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรครุนแรง ให้ทำวัคซีนเร็วขึ้นอีก 1-2 สัปดาห์
6. ทำการจดบันทึกจำนวนไก่ที่เข้าเลี้ยง จำนวนไก่ตาย จำนวนอาหารที่ใช้และจำนวนไข่ดี ไข่เสีย ทุก ๆ วัน เพื่อเป็นประโยชน์กับทางฟาร์มเอง